



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല

കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം, ഹോർട്ടികൾച്ചർ കോളേജ്,
വെള്ളാനിക്കര.

കാർഷിക നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ
(ടെലിഫോൺ: 04872371931)

തൃശ്ശൂർ

E mail: kauagmet@yahoo.co.in

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്ര പഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും,
ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷിവകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ
തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എസ് 11/17, വെള്ളിയാഴ്ച

തീയതി 17.03.2017

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കു കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	18.03.2017	19.03.2017	20.03.2017	21.03.2017	22.03.2017
മഴ (മില്ലി.മീറ്റർ)	2	2	0	0	0
ഉയർന്ന താപനില (°C)	34	34	35	35	35
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	24	24	24	25	25
മേഘവ്യാപ്തി (ഒക്ട)	4	4	4	3	3
കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	85	85	85	80	80
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	60	60	60	50	50
കാറ്റിന്റെവേഗത (കിലോമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ)	008	008	008	006	006
കാറ്റിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	230	230	290	290	290

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

വിളകൾ	വളർച്ചാഘട്ടം/രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
നെല്ല്	ചിനപ്പു പൊട്ടുന്ന പരുവം/ഓലചുരുട്ടിപ്പുഴു	ഒരു ഏക്കർ പാടശേഖരത്തിന് 2 സിസി ട്രൈക്കോഗ്രാമ കാർഡ് ചെറു കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചു വയലിന്റെ പലഭാഗത്ത് ഓലയുടെ അടിഭാഗത്തായി കുത്തി വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ 2 മില്ലി കിനാൽഫോസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു തളിക്കുക.
തെങ്ങ്	പരിചരണമാർഗ്ഗങ്ങൾ	തെങ്ങിനു നനയും പുതയിടലും നൽകാം. തുള്ളി നനയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം 60-70 ലിറ്റർ നൽകണം. ചെറു തൈകൾക്ക് വെയിലിൽ നിന്നും തണലേകി സംരക്ഷണം നൽകണം.
വാഴ	പിണ്ടിപ്പുഴു	പിണ്ടിപ്പുഴുവിന്റെ ആക്രമണം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇലക്കവിളുകളിലും ദ്വാരങ്ങളിലും ക്ലോർപൈറിഫോസ് 2 മി.ലി/ ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂനാൽഫോസ് 2 മി.ലി/ ലിറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.
ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ	-	ഇഞ്ചിയും മഞ്ഞളും നടാൻ സ്ഥലം ഒരുക്കാം.
പച്ചക്കറികൾ (വെണ്ട)	പൗഡറി മിൽഡ്യൂ	ഇലകളിൽ പൂപ്പൽ മാതിരി വെളുത്ത പൊടി കാണുന്ന രോഗമാണ് പൗഡറി മിൽഡ്യൂ. കരാത്തേൻ 0.5 മി.ലി /ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക.