




കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം, ഹോർട്ടികൾച്ചർ കോളേജ്,
വൈള്ളാനിക്കര



കാർഷിക നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ

(ടലിഫോൺ: 04872371931)

തൃപ്പൂർ

E mail: kauagmet@yahoo.co.in

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്ര പഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇത്യും കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷിപകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോട് തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എം.എസ് 43/16, ചൊവ്വാഴ്ച

തീയതി 18.10.2016

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ അന്തരീക്ഷസ്ഥിതി: കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വൈള്ളാനികരയിൽ 15.1 മി.മീ മഴ ലഭിച്ചു. ഏറ്റവും ഉയർന്നതാപനില 30.6 മുതൽ 33.3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാപനില 22.3 മുതൽ 24.1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും, രാവിലപ്പെട്ടെന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത 84 മുതൽ 95 ശതമാനം വരെയും, ഉച്ചതെന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത 61 മുതൽ 75 ശതമാനം വരെയും ആയിരുന്നു. കാറ്റിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 0.5 മുതൽ 1.3 കിലോമീറ്ററും, സുരൂ പ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് ദിനം പ്രതി 2.2 മുതൽ 5.8 മണിക്കൂറും ബാഹ്യപീകരണം ദിനം പ്രതി 2.5 മുതൽ 3.2 മില്ലി.മീറ്റർ വരെയും ആയിരുന്നു.

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	19.10.2016	20.10.2016	21.10.2016	22.10.2016	23.10.2016
മഴ (മില്ലി.മീറ്റർ)	4	3	7	7	8
ഉയർന്ന താപനില (°C)	32	32	32	32	32
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	23	23	23	23	23
മേഘവ്യാപ്തി (കേട്ട)	5	5	5	6	6
കുടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത (%)	80	80	80	80	80
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത (%)	75	75	75	75	75
കാറ്റിന്റെ വേഗത (കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ)	006	006	006	006	006
കാറ്റിന്റെ ദിവ (ഡിഗ്രി)	230	230	230	230	230

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

വിളകൾ	വളർച്ചാജീവനം/രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
നെല്ല് (കാഞ്ചൻ, ഉമ, പൊന്മണി)	നിലമൊരുക്കൽ മുതൽ പരിചുനടീൽ വരെ	മു കന്ന കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള നിലങ്ങൾ ഉണ്ടു ശരിയാക്കുക. 4-5 ഇല പ്രായത്തിൽ ഞാർ പരിച്ചു നടാം. സുരൂയോമോണാസ് കർച്ചറിന്റെ ലായനിയിൽ വേർ അരമണിക്കൂർ കുതിർത്തു നട്ടാൽ പിന്നീട് പോളരോഗം, പോള അഴുകൽ, ഇലപ്പുള്ളി രോഗങ്ങൾ ഉ കുകയില്ല. ഇതിന് ഒരു കി.ഗ്രാം വിത്തിന് 10 ഗ്രാം കർച്ചർ എന്ന കണക്കിന് വൈള്ളത്തിൽ കലക്കി സുരൂയോമോണാസ് ലായനി ഉ കണ്ണാം.
വാഴ	പി പ്രൈഡ്	കുലച്ച വാഴകളിൽ പി പ്രൈഡുവിന്റെ ആക്രമണം കാണുകയാണെങ്കിൽ ആരംഭാദ്ധ്യത്തിൽ തന്നെ 2% വീരുമുള്ള വേപ്പേൺ-വൈള്ളത്തുള്ളി-സോഡ് മിശ്രിതം തളിക്കുക. അധികമായാൽ 3 മി.ലി. ക്ലോർപെപരിഫോസ് ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് എത്തെങ്കിലും പശ ചേർത്തു വാഴത്തെയിൽ തേച്ചു പിടിപ്പിക്കുക.
കുരുമുളക്	ദ്രുതവാട്ടരോഗം	കുരുമുളകിൽ ദ്രുതവാട്ടരോഗം കാണാൻ സാധ്യതയു . സുരൂയോമോണാസ് 20 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക.
പച്ചകരികൾ	-	കാബേജ്, കോളിഫ്രൈവർ എന്നിവയുടെ വിത്തുകൾ തവാരണകളിൽ പാകി മുളപ്പിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്. കാബേജ്, കോളിഫ്രൈവർ മുതലായ പച്ചകരികൾ നട്ടേണ്ടാണ് മണ്ണിൽ സുരൂയോമോണാസ് കർച്ചർ ചേർക്കുന്നതുവഴി കുമിൾരോഗങ്ങൾ ഒരു പരിധി വരെ തടയാവുന്നതാണ്.